

Rougequeue de Moussier

Phoenicurus moussieri

Identification :



Ce petit oiseau trapu a une tête relativement plus grosse et une queue plus courte que les autres rouges-queues. Le mâle adulte ne peut être confondu : il possède un dessous entièrement rouille de même que le croupion. Le reste des parties supérieures est noir. Cependant, son caractère distinctif le plus remarquable est constitué par un large [sourcil](#) blanc qui part du haut du front et se prolonge vers l'arrière au-dessus des yeux et loin sur les côtés du cou. Une importante tache blanche est bien visible sur l'[aile](#). En plumage automnal, les parties noires portent des [liserés](#) bruns. La femelle ressemble à celle du [Rougequeue à front blanc](#), mais elle est plus petite et plus trapue. La queue et surtout les [ailes](#) paraissent plus courtes en raison d'une projection [primaire](#) réduite. Les parties inférieures sont plus fortement teintées de roux sous la poitrine, avec une grande variabilité selon les individus. Les [rectrices](#) centrales sont plus sombres et le milieu des [ailes](#) porte une vague plage claire.

Les jeunes de premier automne et de premier hiver ressemblent aux adultes mais ils présentent des [liserés](#) brunâtres et blanchâtres plus larges que leurs parents, si bien qu'ils paraissent plus ternes. L'âge des individus des 2 sexes peut être déterminé en automne grâce à l'extrémité pâle des grandes [couvertures](#) [alaires](#).

Chant : Ses cris les plus courants comprennent un "huh" fin et un "trrrr" guttural. Son [chant](#), un long babil entrecoupé de notes métalliques, est parfois proche de celui de l'[Accenteur mouchet](#).

Habitat : Cet oiseau localement commun dans les secteurs montagneux fréquente les coteaux rocaillieux couverts de buissons et les pentes sèches avec forêts claires et arbres épars. Son [aire](#) de distribution s'étend du niveau de la mer jusqu'au 3000 mètres d'altitude, mais sa densité est plus importante au-dessus des altitudes moyennes. En hiver, le Rougequeue de Moussier gagne les zones plus basses : bois broussailleux à proximité des côtes, zones cultivées et jardins, semi-désert en bordure du Sahara, oasis.



Distribution : On peut observer cet oiseau exclusivement en Afrique du Nord. Son [aire](#) très compacte s'étend sur la totalité du Maroc, le nord de l'Algérie et de la Tunisie ainsi que la partie la plus occidentale de la Libye.

Comportements : Le Rougequeue de Moussier vit habituellement en solitaire ou en couples. Peu farouche, il se perche à découvert au sommet des buissons, rappelant par cette attitude le

[Tarier pâtre](#). Il agite continuellement sa queue rouille et agite les [ailes](#). Son vol est plus papillonnant que la plupart des autres rouges-queues. Essentiellement sédentaire, ses mouvements se résument à des courts déplacements altitudinaux en période hivernale.

Nidification : Les rouges-queues de Moussier nichent dans des trous et des anfractuosités. En cela, ils ne dérogent pas aux habitudes des autres rouges-queues qui adoptent le même [genre](#) de sites. Le nid peut également être construit dans un buisson ou à terre. Il contient habituellement une ponte qui varie entre 3 et 6 œufs.

Régime : Son régime est principalement [insectivore](#). Il chasse à la manière des gobe-mouches, effectuant des raids aériens au passage des [insectes](#) et les capturant au vol. C'est sans doute cette habitude alimentaire qui a entraîné son transfert par certains scientifiques de la [famille](#) des turdidés à celle des muscicapidés.

Fiche créée le 17/09/2006 par [Daniel LE-DANTEC](#)